



Bulletin agro climatique des stations du CNRA

Juillet et Août 2026





Le *bulletin agro climatique des stations du CNRA* est destiné à appuyer les programmes de recherche.

Il est édité chaque bimestre et présente, pour chaque mois :

- un tableau de la situation pluviométrique décadaire et mensuelle ;
- un tableau des bilans climatiques décadaires et mensuels ;
- l'analyse de la situation pluviométrique ;
- l'impact de la pluviométrie sur les cultures.

Auteurs : DEKOULA Sekpa Charles, AGOH Charly Fernand, OUATTARA Bala Mamadou, YAO Guy Fernand, ESSEHI Jean Lopez et AMANI Kouadio

© CNRA, septembre 2026

Juillet 2026

Tableau 1 : Situation pluviométrique

Station CNRA	Hauteur de pluie en mm						Nombre de jours de pluies				
	Décade			Mois	Normale*	Cumul annuel	Décade			Mois	Cumul annuel
	1	2	3				1	2	3		
Adiopodoumé	32,4	17,7	7,1	57,2	123,6	1166,0	3	3	3	9	60
Dabou	29,2	12,7	4,3	46,2	167,8	1356,5	9	4	5	18	74
La Mé	36,1	42,8	9,2	88,1	136,5	1039,7	7	6	5	18	90
Port Bouët	49,8	20,8	13,2	83,8	133,2	1295,7	9	4	6	19	94
Gagnoa	10,1	0,2	4,2	14,5	90,9	656,1	3	1	3	7	58
Abengourou	5,7	34,7	5,0	45,4	114,9	750,0	2	4	2	8	49
Divo	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	555,3	0	0	0	0	25
Bouaké CV	18,8	7,7	39,3	65,8	80,7	722,6	3	2	4	9	43
Man	35,9	10,6	20,2	66,7	199,3	625,7	5	7	4	16	64
Lataha	22,0	65,2	100,5	187,7	210,9	633,3	1	4	5	10	37

Tableau 2 : Bilan climatique des stations

Station CNRA	Bilan climatique en temps réel (mm)					Bilan climatique / normale		
	Décade précédente	Décade 1	Décade 2	Décade 3	Total Mois	Mois précédent	Mois en cours	Mois suivant
Adiopodoumé	215,5	2,5	-13,8	-24,5	-35,8	316,1	30,6	-41,3
Dabou	394,3	-6,5	-25,5	-33,0	-65,0	403,8	56,6	-56,4
La Mé	192,3	3,6	10,8	-26,3	-11,9	287,3	36,6	-47,4
Port Bouët	263,5	13,5	-15,2	-26,1	-27,8	347,1	21,6	-68,7
Gagnoa	-16,0	-29,2	-38,8	-38,4	-106,4	74,0	-30,0	-46,0
Abengourou	14,5	-29,9	-0,5	-33,2	-63,6	85,7	5,9	-56,1
Divo	39,4	-38,9	-41,2	-41,2	-121,3	103,5	-37,7	-55,6
Bouaké CV	48,2	-18,2	-28,3	2,3	-44,2	10,3	-29,3	28,9
Man	29,0	4,9	-20,4	-11,8	-27,3	66,1	105,3	179,8
Lataha	-41,5	-21,0	23,2	57,5	59,7	-19,6	82,9	98,9

1 - Analyse de la situation pluviométrique du mois de juillet 2026

La pluviométrie du mois de juillet 2026 a été déficitaire dans l'ensemble des stations, avec des déficits variant de -11,0 % à Lataha à -100,0 % à Divo. Les déficits les plus importants ont été observés à Divo (-100,0 %), Gagnoa (-84,0 %), Dabou (-72,5 %), Man (-66,5 %), Abengourou (-60,5 %) et Adiopodoumé (-53,7 %). Les déficits ont été modérés à Port-Bouët (-37,1 %), La Mé (-35,5 %), Bouaké CV (-18,5 %) et Lataha (-11,0 %).

Le nombre de jours de pluie a varié de 0 jour à Divo à 19 jours à Port-Bouët. Les stations côtières ont conservé une fréquence relativement élevée des précipitations, avec 9 à 19 jours de pluie, sans que celle-ci se traduise par des cumuls suffisants. L'activité pluviométrique a été modérée à Gagnoa (7 jours) et Abengourou (8 jours), et quasi nulle à Divo (0 jour). Cette situation a traduit une baisse généralisée des apports pluviométriques au cours du mois, particulièrement marquée à Divo.

2 - Impact des pluies du mois de juillet 2026 sur les cultures

Le bilan climatique du mois de juillet 2026 a été déficitaire dans neufs (9) des dix (10) stations étudiées, avec des déficits variant de -11,9 mm à La Mé à -121,3 mm à Divo, particulièrement marqués au cours des deuxièmes et troisièmes décades dans plusieurs stations. Ces déficits hydriques ont pu entraîner une diminution de l'humidité des sols et créer des conditions défavorables au développement des cultures, notamment à Divo (-121,3 mm), Gagnoa (-106,4 mm), Dabou (-65,0 mm) et Abengourou (-63,6 mm).

À l'inverse, Lataha a enregistré un excédent hydrique de +59,7 mm, traduisant des conditions hydriques favorables au maintien de l'humidité des sols et au développement végétatif des cultures.

Normale = Pluie du mois de la normale 1991-2020 (moyenne stabilisée de 30 ans). Cependant, au niveau de Bouaké CV et Man, les moyennes sur 21 et 16 ans sont respectivement prises en compte à cause de l'absence de données due à la crise sociopolitique.

Bilan climatique = Cumul des pluies – Cumul des ETP Penman. Valeurs de l'ETP Penman extraites de l'étude du BDPA de 1978 sur l'agroclimatologie de la Côte d'Ivoire.

Août 2026

Tableau 1 : Situation pluviométrique

Station CNRA	Hauteur de pluie en mm						Nombre de jours de pluies				
	Décade			Mois	Normale*	Cumul annuel	Décade			Mois	Cumul annuel
	1	2	3				1	2	3		
Adiopodoumé	0,0	2,7	0,0	2,7	42,4	1168,7	4	0	0	4	64
Dabou	1,7	12,8	5,0	19,5	40,8	1376,0	2	2	3	7	81
La Mé	3,4	14,5	12,0	29,9	52,6	1069,6	3	5	4	12	102
Port Bouët	1,1	3,3	3,0	7,4	36,8	1303,1	1	3	4	8	102
Gagnoa	2,0	0,5	3,9	6,4	65,6	662,5	1	1	1	3	61
Abengourou	20,0	11,7	21,5	53,2	49,9	803,2	2	1	3	6	55
Divo	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4	555,3	0	0	0	0	25
Bouaké CV	58,9	5,5	0,0	64,4	137,9	787,0	4	2	0	6	49
Man	76,4	105,6	19,0	201,0	275,8	826,7	6	6	2	14	78
Lataha	63,0	16,0	93,0	172,0	222,9	805,3	2	1	5	8	45

Tableau 2 : Bilan climatique des stations

Station CNRA	Bilan climatique en temps réel (mm)					Bilan climatique / normale		
	Décade précédente	Décade 1	Décade 2	Décade 3	Total Mois	Mois précédent	Mois en cours	Mois suivant
Adiopodoumé	-24,5	-27,3	-23,6	-30,1	-81,0	30,6	-41,3	-16,0
Dabou	-33,0	-30,1	-17,5	-30,0	-77,6	56,6	-56,4	-19,4
La Mé	-26,3	-28,9	-17,8	-23,5	-70,2	36,6	-47,4	-24,2
Port Bouët	-26,1	-33,1	-30,1	-34,8	-98,0	21,6	-68,7	-56,9
Gagnoa	-38,4	-34,3	-34,7	-36,2	-105,2	-30,0	-46,0	2,9
Abengourou	-33,2	-14,3	-21,6	-16,9	-52,8	5,9	-56,1	-4,8
Divo	36,0	-35,6	-34,4	-39,0	-109,0	-37,7	-55,6	-15,9
Bouaké CV	2,3	23,9	-30,5	-38,0	-44,6	-29,3	28,9	57,1
Man	-11,8	45,4	74,6	-15,0	105,0	105,3	179,8	166,3
Lataha	57,5	23,0	-25,0	50,0	48,0	82,9	98,9	102,6

1 - Analyse de la situation pluviométrique du mois d'août 2026

La pluviométrie du mois d'août 2026 a été déficitaire dans la majorité des stations, avec des déficits variant de -22,8 % à Lataha à -100,0 % à Divo. Les déficits les plus importants ont été observés à Divo (-100,0 %), Adiopodoumé (-93,6 %), Gagnoa (-90,2 %), Port-Bouët (-79,9 %), Bouaké CV (-53,3 %) et Dabou (-52,2 %). Des déficits modérés ont été enregistrés à La Mé (-43,2 %), Man (-27,1 %) et Lataha (-22,8 %), tandis qu'Abengourou a connu un léger excédent (+6,6 %).

Le nombre de jours de pluie a varié de 0 jour à Divo à 14 jours à Man. Dans le Sud et sur le littoral, la faible activité pluviométrique observée correspond à la période de petite saison sèche, tandis que les cumuls plus importants enregistrés à Man (201,0 mm) et Lataha (172,0 mm) reflètent une pluviométrie plus soutenue dans ces localités.

2 - Impact des pluies du mois d'août 2026 sur les cultures

Le bilan climatique du mois d'août 2026 a été déficitaire dans huit (8) des dix (10) stations étudiées, avec des déficits variant de -44,6 mm à Bouaké CV à -109,0 mm à Divo. Ces déficits hydriques ont pu entraîner une diminution de l'humidité des sols et créer des conditions défavorables au développement des cultures, notamment à Divo (-109,0 mm), Gagnoa (-105,2 mm), Port-Bouët (-98,0 mm) et Adiopodoumé (-81,0 mm).

À l'inverse, Man (+105,0 mm) et Lataha (+48,0 mm) ont enregistré des excédents hydriques, traduisant des conditions hydriques favorables au maintien de l'humidité des sols et au développement végétatif des cultures.

Normale = Pluie du mois de la normale 1991-2020 (moyenne stabilisée de 30 ans). Cependant, au niveau de Bouaké CV et Man, les moyennes sur 21 et 16 ans sont respectivement prises en compte à cause de l'absence de données due à la crise sociopolitique

Bilan climatique = Cumul des pluies – Cumul des ETP Penman. Valeurs de l'ETP Penman extraites de l'étude du BDPA de 1978 sur l'agroclimatologie de la Côte d'Ivoire.

Conclusion

L'analyse du bimestre juillet-août 2026 révèle une forte variabilité des conditions pluviométriques et hydriques. Les stations du Sud et du Littoral ont connu des déficits marqués, en lien avec la petite saison sèche du régime bimodal, tandis que Lataha (Nord) et Man (Ouest) ont enregistré des conditions hydriques plus favorables au maintien de l'humidité des sols et au développement des cultures.

Normale = Pluie du mois de la normale 1991-2020 (moyenne stabilisée de 30 ans). Cependant, au niveau de Bouaké CV et Man, les moyennes sur 21 et 16 ans sont respectivement prises en compte à cause de l'absence de données due à la crise sociopolitique

Bilan climatique = Cumul des pluies – Cumul des ETP Penman. Valeurs de l'ETP Penman extraites de l'étude du BDPA de 1978 sur l'agroclimatologie de la Côte d'Ivoire.



CNRA
Centre National de Recherche Agronomique
Siège social : Km 17, route de Dabou, Abidjan
01 B.P. 1740 Abidjan 01, Côte d'Ivoire
Tél: (225) 27 22 48 96 24 -Fax: (225) 27 22 48 96 11
E-mail : info@cnra.ci
Site Web : www.cnra.ci

© CNRA, septembre 2026